

**XV. VÝROČNÝ KONGRES  
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI**

**Abstrakt**

**Forma: prednáška / sesterský seminár**

**Názov: Intravitreálna aplikácia Triamu**

**Autor, spoluautori: Kubišová B, Slobodníková Ľ, Gajdošová M**

**Pracovisko: Oftal s.r.o., Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia,  
Zvolen**

-----  
**Súhrn**

**Indikáciou pre intravitreálnu aplikáciu Triamu je edém makuly pri diabetickej retinopatii, oklúzii centrálnej vény sietnice alebo jej vetvy a pri chronickej uveitide. Triam sa podáva intravitreálne za sterilných podmienok na operačnej sále po predchádzajúcom riedení.**

**Návod na purifikáciu Triamu:**

**Materiál:**

**Triam 40 mg/ 1 amp., Aqua pro inj.**

**trojcestný ventil, filter a 250mi, predlžovacia hadica, 1x10 ml a 1x2ml**

**Bowmanova striekačka, 1x tuberkulínová striekačka,**

**Postup:**

**za sterilných podmienok ( na operačnej sále) sa Triam natiahne do 2ml striekačky, dotiahne sa aquou do 2 ml a nechá sa sedimentovať napojený na filter a trojcestný ventil. Po sedimentácii sa aqua cez filter vystriekne von a opakovane sa dotahuje aqua z 10ml striekačky cez ventil až do spotrebovania celých 10ml. Po purifikácii sa k Triamu, ktorý ostal v 2ml striekačke dotiahne aqua do 1,0 ml objemu striekačky ( v 0,1 ml= bude 4mg Triamu). Intravitreálne podávame 2-4mg Triamu.**