

**XV. VÝROČNÝ KONGRES  
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI**

**Abstrakt**

Forma: prednáška - kazuistika

Názov: Primárny intraokulárny lymfóm ?

Autor, spoluautori: Gajdošová M, Ondrejková M

Pracovisko: Oftal s.r.o., Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia,  
Zvolen

**Súhrn**

- Primárny intraokulárny lymfóm (PIOL) je špecifický podtyp očného lymfómu s rôznymi klinickými prejavmi a veľmi zlou prognózou, preto naň treba myslieť u pacientov s refrakternou uveitídou, vitritídou, chorioidálnymi masami a lymfómom CNS.
- Diagnostika PIOL je vždy náročná a zdĺhavá.
- Nové diagnostické metódy a terapeutické postupy môžu urýchliť diagnostiku a predĺžiť dobu prežívania pacienta.
- Lokálna liečba: Intravitreálne inj. MTX (400 ug v 0,1 ml, 11-25 inj/ 1rok, do rezorpcie exsudátov)
  
- V našom prípade laboratórne výsledky vylúčili zápalový pôvod nálezu na OP, preto sme uvažovali o PIOL
- NMR nepotvrdila prítomnosť patologických zmien v mozgu.
- Postupne došlo ku spontánnej regresii lokálneho nálezu a zlepšeniu vízu pacienta, z 0,05 na 0,7 bez akejkoľvek celkovej i lokálnej liečby.
- Čo bolo príčinou lokálneho nálezu a ťažkostí pacienta je pre nás zatiaľ záhadou?
- Pacient zostáva v našej dispenzárnej starostlivosti

