

II. Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti Banská Bystrica 2011

Abstrakt

Forma: prednáška

Názov: Účinnosť fixnej kombinácie v liečbe glaukómu

Autor, spoluautori: Lysina P., Pohánková Z., Ondrejková M.,

Pracovisko: Oftal s.r.o., Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia,
Zvolen

Súhrn

Cieľ práce: hodnotenie účinnosti a vplyvu na stabilizáciu zrakových funkcií fixnej kombinácie timolol a dorsolamid (Cosopt). pri liečbe primárneho glaukómu s otvoreným uhlom (PGOU)

Materiál a metodika: hodnotený bol súbor 78 očí 39 pacientov (100%) s PGOU, liečených fixnou kombináciou timolol a dorsolamid, s minimálnou dobou sledovania 24 mesiacov. U všetkých pacientov bolo pred nasadením liečby vykonané kompletné vyšetrenie pozostávajúce z vyšetrenia NKCZO, VOT a DTK, biomikroskopie, gonioskopie, perimetra a HRT. Po 2 rokoch boli hodnotené NKCZO, VOT, perimenter a HRT.

Výsledky: účinnosť fixnej kombinácie timolol a dorsolamid (Cosopt) bola u pacientov po vynechaní predchádzajúcej liečby (wash off 6 týždňov) 27,5%. Po doplnení alebo výmene liečby (bez prechádzajúceho wash off) sa účinnosť pôvodnej liečby zvýšila o 19.5%. Po 2 rokoch sledovania bola zistená progresia na perimetri na 7 očiach (8,9%) u 4 pacientov. Progresia na HRT bola zistená na 8 očiach (10,2%) u 6 pacientov. Len na 4 očiach (5,1%) u 2 pacientov bola progresia na perimetri aj HRT.

Záver: fixná kombinácia timolol a dorsolamid je účinnou metódou liečby PGOU, ktorá zaisťuje dobrú stabilizáciu zrakových funkcií a zrakového nervu.

Kľúčové slová: fixná kombinácia, stabilizácia perimetra, stabilizácia HRT, účinnosť liečby